

Agivit E + Selen flüssig

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion

bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern

Hoher Gehalt an Selen und Vitamin E

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Selengehalt und Mindestgehalt an Vitamin E je kg Alleinfuttermittel mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 % von 50 mg für Schweine, 40 mg für Geflügel oder einem Mindestgehalt an Vitamin E je Tier und Tag von 100 mg für Schafe und 300 mg für Rinder.

Zusammensetzung

Traubenzucker, Natriumchlorid

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0,10 %
Rohfaser	0,10 %
Rohfett	13,60 %
Rohasche	0,25 %
Natrium	0,04 %
Lysin	0,00 %
Methionin	0,00 %
Feuchtigkeit	59,10 %

Empfohlene Fütterungsdauer

- Kühe: zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.
- Sauen: sieben Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und sieben Tage vor bis drei Tage nach der Paarung.
- Weibliches Geflügel: während des Östrus.
- Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität.

Einsatzempfehlung

Bei besonderen Leistungsanforderungen sowie in Belastungsphasen, als Impfbegleitung und zur allgemeinen Vitalisierung. Zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung.

Gehalt an Zusatzstoffen je L

Vitamine:

Vitamin E aus all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) 150.140 mg

Spurenelemente:

Selen aus Natriumselenit (3b801) 92,1 mg

Antioxidationsmittel:

Butylhydroxytoluol (BHT) (E321) 98 mg

Konservierungsstoffe:

Sorbinsäure aus Kaliumsorbat (1k202) 750 mg



Agivit E + Selen flüssig

Fütterungsempfehlung

Geflügel, Schweine: 500 - 1.000 ml auf 1.000 L

Rinder: 5 - 10 ml/100 kg KG/Tag

Mindestens über drei Tage verfüttern.

Fütterungshinweis

Das Diätergänzungsfuttermittel darf Selen in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehalts in Alleinfuttermitteln enthalten. Dieses Diätergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Selen nur bis 0,2 % der Tagesration verfüttert werden.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Stand: März 2023